

Marteloscope : COD14

0 10 20 30 m

Equidistance / Äquidistanz : 1 m

Surface / Fläche : 1 ha



Arbres / Bäume [459]
vivants / lebend

DG / Dg [331]

EP / Fi [15]

ME / Lä [13]

TI / Li [56]

HE / Bu [21]

ER / BAh [17]

AL / Mehl [2]

CE / Ki [2]

HX / StePa [1]

OR / Ulme [1]

● Bloc erratique / Findling, Stein

✕ Souche levée / Wurzelstock

--- Layon / Rückegasse

--- Coulisce / Rinne

— Périmètre / Perimeter [1 ha]

Etiquette rouge = arbre sec sur pied


Rote Nummern = Stehendtotholz

Trait vert = arbre anciennement élagué (>3 m)

Grüner Strich = ehemals Wertgeasteter Baum (>3 m)

Prendre en compte les arbres de bordure lors de l'exercice

Randbäume bei der Übung berücksichtigen



Caractéristiques du peuplement COD14 (février 2026)


Surface **1.00 ha** | Seuil d'inventaire **17.5 cm** | Nombre d'essences **10** | Résineux [% V] **87.8%** | Feuillus [% V] **12.2%** | Volume de la tige moyenne **0.89 sv**

 **Type de station : 12a-Hêtraie à Dentaire typique**  **NaiS 2B**


Mélange des essences

Essences	N	G [m³]	V* [sv]
Douglas	331	30.5	337.6
Epicéa	15	1.4	15.5
Mélèze	13	0.6	5.5
Tilleul	56	2.2	21.2
Hêtre	21	1.6	17.6
Erable sycomore	17	0.8	8.1
Alisier blanc	2	0.1	1.0
Cerisier	2	0.1	1.0
Houx	1	0.1	0.7
Orme	1	0.1	0.5
Total (arbres vivants)	459	37.4	408.5
Bois mort sur pied en plus	21 (4%)	1.1	11.3 (3%)


Répartition des tiges et du volume par catégories de DHP par hectare



Répartition des essences [% V]



Répartition des essences [% N]




Répartition des tiges par classe de DHP


Classes DHP	N	G [m³]	V* [sv]
Petits bois (P)	276	13.1	124.2
Bois moyens (M)	177	22.9	266.4
Gros bois (G)	6	1.4	17.9

P : Catégories 20, 25 et 30 cm
M : Catégories 35, 40, 45 et 50 cm
G : Catégories 55 cm et supérieures

Nb arbres par essence et classes de DHP




Proportion des petits, moyens et gros bois [% V]



PMG selon Biolley (Tarif NE)	
P : 17.5 - 32.5	30.4%
M : 32.5 - 52.5	65.2%
G : > 52.5 cm	4.4%
PMG tige moyenne	0.89 sv

Appréciation globale de l'irrégularité



Ce triangle révèle 3 groupes de peuplement : (1) une zone centrale de structure irrégulière [IR et IF]. Aucune des 3 classes de grosseur n'est excédentaire ou déficitaire.
(2) Un second groupe de peuplements au sein desquels deux classes se combinent et une classe est nettement déficitaire [P-M / M-G / P-G].
(3) Un troisième groupe de peuplements où une seule classe de diamètre domine nettement [P / M / G].